

Complicaties

Ondanks alle zorgvuldigheid, is een complicatie op het gebied van de anesthesie niet altijd te voorkomen. Meestal hebben grote complicaties van de anesthesie te maken met reeds bestaande (verborgen) medische problemen. Bespreek met uw anesthesist of u verhoogd risico heeft voor uw ingreep.

Voorkomende complicaties:

- Last van uw keel door het beademingsbuisje wat tijdens de operatie is gebruikt.
- Bij het plaatsen van het beademingsbuisje kan het gebit beschadigen.
- U kunt een allergische reactie krijgen van medicatie die wordt toegediend.
- Door een ongelukkige houding kan een zenuw beklemd raken of uitgerekt worden, dit kan een (meestal tijdelijke) uitval of irritatie van de betreffende zenuw veroorzaken.
- Een ruggenprik geeft soms niet voldoende pijnstilling tijdens de operatie. De anesthesioloog bespreekt dan met u welke andere, aanvullende anesthesietechniek de oplossing kan bieden.
- Na een ruggenprik kan bij het rechtop zitten soms een vervelende typische hoofdpijn ontstaan die vrijwel meteen verdwijnt bij het gaan liggen. Plat in bed liggen en coffeïne gebruiken (koffie en cola) is meestal voldoende zijn om binnen enkele dagen van het probleem af te zijn.